


Ilidi



Reakcije ilida sa C=O


1. Fosforni ilidi: - fosforani (*Wittig*-ova reakcija, *Corey-Fuchs*-ova reakcija)
- fosfonati (*Horner-Wadsworth-Emmons*-ova reakcija, *Sayfert-Gilbert*-ova reakcija)
2. Sumporni ilidi: *Corey-Chaikovski*-jeva reakcija

Druge metode za olefinaciju C=O


3. *Peterson*-ova olefinacija
4. *Julia*-eva olefinacija
5. *Tebbe*-ova olefinacija

lidi


1. Fosforni ilidi (1.1 Fosforani)



1.1.1. Dobijanje fosforana



Fosfonijum-soli su uglavnom stabilne, kristalne supstance, definisane tačke topljenja.






Ilidi


1. Fosforni ilidi (1.1 Fosforani)

1.1.1. Dobijanje fosforana

- Nestabilizovani ilidi se ne mogu izolovati, već se pripremaju *in situ*:



- Stabilizovani ilidi ($\text{R}^2 = \text{elektron-privlačna grupa}$) se mogu izolovati i čuvati do upotrebe:






Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.1 Fosforani)

1.1.2. Stabilnost fosforana


Fosforni ilidi, prevashodno nestabilizovani, reaguju brzo sa vodom i kiseonikom, pa se reakcije moraju izvoditi u inertnoj atmosferi:




Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.1 Fosforani)

1.1.3. Reakcija fosforana sa aldehydima i ketonima (*Wittig-ova reakcija*)



- Mehanizam




Sve faze reakcije su povratne, osim poslednjeg koraka: stvaranje jake $\text{P}=\text{O}$ veze predstavlja termodinamički motiv za odvijanje reakcije.

Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.1 Fosforani)


1.1.3. Reakcija fosforana sa aldehidima i ketonima (*Wittig-ova reakcija*)

- Primena u sintezi (simetrični ilidi)



Chem. Commun. **1995**, 2391.

Ph₃P=C(H)OMe:
reagens za
homologizaciju
aldehida




J. Am. Chem. Soc. **1995**, 117, 10391.

Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.1 Fosforani)

1.1.3. Reakcija fosforana sa aldehidima i ketonima (*Wittig-ova reakcija*)

- Stereoselektivnost u reakcijama nesimetričnih ilida



Favorizovanje termodinamičkog proizvoda – pomeranje ravnoteže ka reaktantima: viša temperatura, nepolaran rastvarač, stabilizovani ilidi ($R^1 = \text{EWG}$), e-bogat P-atom (alkil grupe na fosforu), višak baze.



Favorizovanje kinetičkog proizvoda: niska temperatura, nestabilizovani ilidi ($R^1 = \text{alkil}$), e-siromašan P-atom (Ph, *p*-Cl-Ph).

Ilidi



1. Fosforni ilidi (1.1 Fosforani)

1.1.3. Reakcija fosforana sa aldehidima i ketonima (*Wittig-ova reakcija*)

- Primena u sintezi (nesimetrični ilidi)



Tetrahedron Lett. **1988**, 29, 2059.





Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.1 Fosforani)

1.1.3. Reakcija fosforana sa aldehidima i ketonima (*Wittig-ova reakcija*)



- *Schlosser-ovom* modifikacijom dobijaju se *E*-alkeni sa nestabilizovanim ilidima




Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.1 Fosforani)

1.1.3. Reakcija fosforana sa aldehidima i ketonima (*Corey-Fuchs-ova reakcija*)




Intermedijerni Li-acetilid se može *in situ* alkilovati: dobijanje unutrašnjih alkina.





lidi

1. Fosforni ilidi (1.2 Fosfonati)



Fosfonati su anjoni, nukleofilni i od fosforana

1.2.1. Dobijanje fosfonata (*Michaelis-Arbuzov-ljeva reakcija*)




Reakcija sa izvodi na visokoj temperaturi (bez rastvarača), kako bi R^1X (npr. EtBr) ispario iz reakcionog suda.


Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.2 Fosfonati)

1.2.1. Dobijanje fosfonata (druge metode)



Ovaj pristup naročito je pogodan za dobijanje kompleksnijih fosfonata:




Org. Lett. 2005, 7, 3371.


Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.2 Fosfonati)

1.2.2. Reakcija fosfonata sa aldehidima i ketonima (*Horner-Wadsworth-Emmons-ova reakcija (HWE)*)



- Mehanizam



Baze: NaH, NaNH₂, MeONa, EtONa, **LiCl/DBU**



Rastvarači: DME, THF, Et₂O, DMF, PhH, MeOH, MeCN

Ilidi


1. Fosforni ilidi (1.2 Fosfonati)

1.2.2. Reakcija fosfonata sa aldehidima i ketonima (*Horner-Wadsworth-Emmons-ova reakcija*)

- Primena u sintezi



J. Org. Chem. **1994**, 59, 720.




Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.2 Fosfonati)

1.2.2. Reakcija fosfonata sa aldehidima i ketonima (HWE reakcija)

- Stereoselektivnost





Voluminozne grupe na fosforu (R^1) favorizuju nastanak *E*-alkena.

Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.2 Fosfonati)

1.2.2. Reakcija fosfonata sa aldehidima i ketonima (HWE reakcija)

- Stereoselektivnost




J. Am. Chem. Soc. **1981**, *103*, 6967.

Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.2 Fosfonati)

1.2.2. Reakcija fosfonata sa aldehidima i ketonima (HWE reakcija)

- Stereoselektivnost



Dodatkom Li-soli povиava se kiselost α -H-atoma, koji se sada može deprotonovati i slabim aminskim bazama.






Izbegavanjem jako-baznih reakcionih uslova reakcija se može primeniti na visoko-enolizabilnim aldehidima, bez bojazni od epimerizacije u α -položaju.


Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.2 Fosfonati)

1.2.2. Reakcija fosfonata sa aldehidima i ketonima (*Still-Gennari* modifikacija HWE reakcije)




18-kruna-6



Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.2 Fosfonati)

1.2.2. Reakcija fosfonata sa aldehidima i ketonima (*Still-Gennari* modifikacija HWE reakcije)





1. Koriste se kalijumove baze, jer je usled voluminoznosti K^+ -jon slabije vezan u helatu, što se dodatno pospešuje eksternim kompleksiranjem pomoću 18-kruna-6 .
 2. Za atom fosfora vezane su dve elektron-privlačne trifluoretil-grupe, što čini fosfor elektrofilnijim i ubrzava građenje oksafosfetana.
- ⇒ Favorizovano nastajanje kinetičkog (*Z*)-alkena.

Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.2 Fosfonati)

1.2.2. Reakcija fosfonata sa aldehidima i ketonima (*Still-Gennari* modifikacija HWE reakcije)




J. Org. Chem. 1998, 63, 8638.


Ilidi

1. Fosforni ilidi (1.2 Fosfonati)

1.2.3. Reakcija fosfonata sa aldehidima i ketonima (*Seyefерth-Gilbert-ova reakcija*)



- Mehanizam




Ilidi



1. Fosforni ilidi (1.2 Fosfonati)

1.2.3. Reakcija fosfonata sa aldehidima i ketonima (*Seyefерth-Gilbert*-ova reakcija)

- Dobijanje *Bestmann-Ohira*-inog reagensa




- Primena u sintezi





Ilidi

2. Sumporni ilidi



2.1. Dobijanje sumpornih ilida






Sumporni ilidi se, usled nestabilnosti, obično prave in situ i u daljim transformacijama koriste direktno, bez prethodnog izolovanja.

Ilidi

2. Sumporni ilidi

2.2. Reakcije sumpornih ilida sa karbonilnim jedinjenjima (*Corey–Chaykovsky-jeva reakcija*)




Ilidi

2. Sumporni ilidi

2.2. Reakcije sumpornih ilida sa karbonilnim jedinjenjima (stereochemija adicije)

Prva faza reakcije, koja određuje stereochemijski ishod, je reverzibilna i nastaju termodinamički stabilniji proizvodi.





Ilidi

2. Sumporni ilidi

2.2. Reakcije sumpornih ilida sa karbonilnim jedinjenjima (stereohemija adicije)

U reakciji sulfoksonijum-ilida ili stabilizovanih sulfonijum-ilida sa cikličnim ketonima, nastaju proizvodi ekvatorijalnog napada na karbonilnu grupu (TD):





Ilidi

2. Sumporni ilidi

2.2. Reakcije sumpornih ilida sa karbonilnim jedinjenjima (stereohemija adicije)

U reakciji nestabilizovanih sulfonijum-ilida sa cikličnim ketonima, nastaju proizvodi aksijalnog napada na karbonilnu grupu (KIN):





Mali nukleofili vrše aksijalan napad, dok je ekvatorijalan napad favorizovan u slučaju voluminoznijih nukleofila.

Ilidi

2. Sumporni ilidi

2.3. Reakcije sumpornih ilida sa 1,4-enonima




Nastajanje termodinamički stabilnijih ciklopropana objašnjava se reverzibilnošću 1,2-adicije stabilizovanih sulfoksonijum-ilida:



Ilidi

2. Sumporni ilidi




2.4. Primena sumpornih ilida u sintezi



Ilidi


2. Sumporni ilidi

2.5. Transformacije proizvoda




Druge metode za olefinaciju C=O

3. Peterson-ova olefinacija



3.1. Dobijanje β -hidroksilana




Druge metode za olefinaciju C=O


3. Peterson-ova olefinacija

3.2. Reakcije β -hidroksisilana

Bazno-katalizovana eliminacija:



Kiselo-katalizovana eliminacija:




\Rightarrow Geometrija dvostrukе veze zavisi od relativne stereohemije polaznog β -hidroksisilana i izbora reakcionih uslova za eliminaciju.


Druge metode za olefinaciju C=O

3. Peterson-ova olefinacija

3.3. Primena u sintezi




J. Am. Chem. Soc. **2001**, *123*, 4851.




Org. Lett. **2003**, *5*, 1697-1700.

Druge metode za olefinaciju C=O

4. Julia-eva olefinacija



4.1. Mehanizam




U reakcija obično nastaje smesa *E*- i *Z*-alkena, kao posledica odsustva diastereoselektivnosti pri adiciji litiovanog sulfona na aldehid.


Druge metode za olefinaciju C=O

4. Julia-eva olefinacija

4.2. Primena u sintezi




Julia-Kocienski-jeva olefinacija omogućava selektivno dobijanje *E*-olefina:



Org. Lett. 2001, 3, 1685-1688.


Druge metode za olefinaciju C=O

5. Tebbe-ova olefinacija



Pored aldehida i ketona, Tebbe-ovim reagensom se može izvršiti i olefinacija estara (nastaju enol-etri) i amida (nastaju enamini).


5.1. Mehanizam




Druge metode za olefinaciju C=O

5. Tebbe-ova olefinacija

5.2. Primena u sintezi



J. Am. Chem. Soc. **1997**, *119*, 8438-8450.



Tetrahedron Lett. **2000**, *41*, 5607-5611.