



Poglavlje 22: Hemija supstituisanih benzena

Stabilizacija benzilnom rezonancijoma +/•/-




2-propenil-
-(alil-) sistem



fenilmetil-(benzil-) sistem


Prošireni π -sistemi za prenos naelektrisanja

Organski provodnici i njihova primena




poli(*p*-fenilen-vinilen)

(elektroluminiscentni ekrani,
kod mobilnih telefona)




polianilin

(provodnik; elektromagnetni štitnik
elektronskih kola; antistatik, tepih)



polipirol



(elektrolit;
presvlačenje monitora;
osetljivi uređaji)



politiofen






(field-effect tranzistori,
skao kod kontrolnih instrumenata u supermarketima;
antistatik, kod fotografskih filmova)

Benzilno halogenovanje



Benzilni radikali su reaktivni intermedijeri prilikom α -halogenovanja alkilbenzena


Mehanizam benzilnog halogenovanja



Benzil-Katjon (S_N1 reakcija)





(4-metoksifenil)metil-
-4-metilbenzensulfonat
(primarni benzil-tozilat)



1-(etoksimetil)-4-metoksibenzen


Mehanizam monomolekulske nukleofilne supstitucije benzilnih sistema



benzil-katjon

$\xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}}$ proizvod

S_N2 je ubrzana reakcija




81%

(brommetil)benzen
(benzil-bromid)


feniletanonitril
(fenilacetonitril)

(~100 puta brže od S_N2 -reakcija primarnih bromalkana)


Delokalizovano
prelazno stanje



Kiselost benzilnog vodonika:




Rezonanciona stabilizacija benzil-anjona




Poređenje sa propenom $pK_a \sim 40$

Deprotonovanje metilbenzena




Oksidacija i redukcija u benzilnom položaju

Potpuna benzilna oksidacija alkil-niza




- raskidanje C-C veze




Moguće reakciju
zaustaviti u ovoj fazi

Selektivna oksidacija benzil-alkohola mangandioksidom



nepromenjeno

Raskidanje benzil-etara hidrogenolizom






Zaštitna grupa

Višak
„sporedni proizvod“

deprotektovano



Primena hidrogenolize u organskoj sintezi: sinteza jedinjenja iz eudesmanske vrste etarskih ulja

Zaštita fenilmetil-grupom u kompleksnoj sintezi




80%

(R = $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2$)





93%





94%


(smesa E i Z izomera)




99%



98%




98%







Benzenol ili Fenol (karbolna kiselina)

Keto- i enolni oblici fenola




(Fenol je enol!?)

Nomenklatura




Primeri fiziološki aktivnih fenolnih jedinjenja




rezveratol

(iz grožđa, smatra se
da sprečavaju pojavu raku)



kapsaicin

(aktivni sastojak
ljute paprike i bibera)




epigalokatehin-3-galat
(iz zelenog čaja, smatra se
da sprečava pojavu raka)




Ljuta (čili) paprika, *Capsicum
frutescens* (Južna Amerika)


Kiselost

rezonancione strukture fenoksidnog anjona




- nitrofenol pK_a 7.15
- uticaj NO_2 kao suspstituenata: -I i -R






2,4-dinitrofenol

$pK_a = 4,09$



2,4,6-trinitrofenol
(pikrinska kiselina)

$pK_a = 0,25$




4-metilfenol
(*p*-krezol)

$pK_a = 10,26$


Kiselost pikrinske kiseline uporediva sa kiselošću mineralnih kiselina!!!

Dobijanje fenola

Problem u EAS:



- Kako dobiti “⁺OH” ili ekvivalent
- dobra odlazeća grupa u prstenu:
Nukleofilna aromatična supstitucija



Tri moguća mehanizma:

1. Adicija- eliminacija

prsten aktiviran elektron-privlačnom grupom

2. Eliminacija-adicija

nema aktivacije:reakcija preko BENZINA

3. Fenil-katjon


super odlazeća grupa $L = N_2$,

Nukleofilna aromatična ipso-supstitucija

1. Adicija eliminacija:




$\text{Nu} = \text{OH}$




$\text{Nu} = \text{NH}_2$

ipso-supstitucija: zamena grupe koja nije vodonik






Mehanizam nukleofilne aromatične supstitucije

FAZA 1. Adicija (olakšana rezonancionom stabilizacijom)





negativna šarža stabilizovana je rezonancijom sa orto- i para- NO_2 -grupama.

FAZA 2. Eliminacija (prikazana je samo jedna rezonancijska struktura)




meta NO_2 -grupe ne omogućavaju rezonancijsku stabilizaciju negativne šarže.



Bez elektron-privlačne grupe u jezgru, ali sa dobrom odlazećom grupom L, ekstremni uslovi




2,4,5-Trihlorofenoksi-sirćetna kiselina (2,4,5-T): Butil-estar "Agent Orange" defoliant u Vijetnamskom ratu




2: Eliminacija-Adicija: benzin kao intermedijer




Mehanizam: razjašnjenje obeležavanjem sa ^{14}C



benzin (veoma napregnut prsten)



A




B


“Biradikaloidna” struktura

Mehanizam nukleofilne supstitucije jednostavnih halogenarena


FAZA 1. Eliminacija




FAZA 2. Adicija



Sinteza fenola




1.




Adicija-
Eliminacija

2.




Eliminacija-Adicija

Benzin se može „uhvatiti“ Diels-Alderovom reakcijom





3. molekul azota kao super odlazeća grupa




Dobijanje fenola iz arendiazonijum-soli

Diazotovanje




Strategija za sintezu fenola polazeći od benzena:




Hemija fenola

fenoli kao alkoholi




a. Fenol je slabo bazan




- slabije bazan od alkohola, jer elektronski par učestvuje u rezonaciji sa benzenskim prstenom


b. Ne formira
fenil-katjon




c. Ali je fenol dobra odlazeća grupa



d. Fenil-etri: Alkoksibenzeni




Williamson-ova sinteza fenil-etara fenoksidni anjon nukleofil



Vežba 22-15


Zašto se raskidanjem alkoksibenzena kiselinama ne dobija halogenbenzen i alkohol?

e. Fenoli grade estre




Vežba 22-16


Objasnite zašto u sintezi tilenola (naglasak 22-3) nastaje amid, a ne ester. (**Pomoć:** podsetite se odeljka 6-8)





f. Elektrofилна aromatična supstitucija



Para proizvod
dominira






Halogenovanje bez katalizatora!





g. Bazni uslovi: reakcije fenolata

Kondenzacija enolata slično aldolnim reakcijama



Fenol-formaldehidne smole (bazni uslovi)


Sinteza fenolne smole




polimer + $n \text{H}_2\text{O}$

Šper-ploča, izolator, iverica, laminati....



Fenol-formaldehidne smole (kiseli uslovi)




Fenol-formaldehidne smole (kiseli uslovi)





Fenol-formaldehidne smole (kiseli uslovi)




Fenol-formaldehidne smole (kiseli uslovi) *razgranati polimer*




Kolbeova reakcija sa ugljen-dioksidom




Adolph W. H. Kolbe
1818-1884




Reimar-Thiman-ovo formilovanje



Gatterman-Koch-ova reakcija




Klajzenovo (Claisen) premeštanje



Ludwig Claisen
1851-1930



Mehanizam Claisen-ovog premeštanja




Proširenje elektrocikličnih reakcija. Kopeovo (Cope) premeštanje analogno Klajzenovom premeštanju

Benzendioli-Benzohinoni: Redoks par

Sinteza cikloheksadiendiona (benzohinona) oksidacijom
1,2- i 1,4-benzendiola






o-Benzohinon





nizak prinos

(nestabilno)




p-Benzohinon
92%

Redoks odnos između 2,5-cikloheksadien-1,4-diona i 1,4-benzendiola (*p*-benzohinon/hidrohinon)





Hinoni su oksidansi, jer mogu da prime elektrone. Elektron-privlačni supstituenti na hinonu povećavaju njegovu oksidacionu moć.




Tetracijanobenzohinon
(TCNQ)



Benzohinoni kao elektron-siromašni alkeni

1,4-adicija (enoni)





ubihinoni ($n = 6, 8, 10$)
(koenzim Q)






redukovani oblik koenzima Q
(redukovani Q, ili QH₂)



Biohemijska konverzija kiseonika u vodu preko superoksida, O_2^- , i hidroksi-radikala, $\bullet\text{OH}$


FAZA INICIRANJA

Započinje reakcijom hidroksi-radikala sa dienskim delom iz fosfolipida:




pentadienil-radikal




PROPAGACIONA FAZA 1




PROPAGACIONA FAZA 2.





β -fragmentacija lipidnog alkoksi-radikala






Umrežavanje proteina reakcijom sa nezasićenim aldehidima



Reakcije vitamina E sa lipidnim hidroperoksi i alkoksi-radikalima





Regeneracija vitamina E vitaminom C





Arenamini

Reaguju kao amini:



$pK_a = 10.64$


Anilin




Slabija baza od RNH_2 ($pK_a = 11-12$), zbog rezonancije, slično kao što su fenoli slabije baze od alkanola

Reakcija arenamina sa azotastom kselinom

Dobijanje i reakcije diazonijum soli




Reakcija primarnih amina sa nitrozil-katjonom




Razlaganje primarnih *N* -nitrozoamina

Mehanizam razlaganja primarnih *N*-nitrozamina

FAZA 1. Premeštanje u diazohidroksid



FAZA 2. Gubitak vode i nastajanje diazonijum-jona







FAZA 3. Gubitak azota uz nastajanje karbokatjona




R = Alkil → raspadanje, R = Aren → stabilan

Nitrozovanje 2° i 3° amina





Dobijanje fenola iz arendiazonijum soli




Strategija za sintezu fenola polazeći od benzena:




Arendiazonijum soli




Stabilizacija fenildiazonijum-jona rezonancijom





b. Eliminacijom N₂ formira se reaktivni fenil-katjon




Reakcija arendiazonijum soli:




Sandmeyer-ova reakcija





Reduktivno uklanjanje diazonijum-grupe




Strategija:




Iskoristi se amino supstituent kao aktivator za EAS, a potom se ukloni.

Sinteza 1,3-dibrombenzena preko diazonijum-soli





Vežba 22-26

Predložite sintezu 1,3,5-tribrombenzena iz benzena.





Diazokuplovanjem se dobijaju boje

Ovo je EAS sa diazonijum solima kao elektrofilima.
Reakcija samo sa aktiviranim arenima (fenol ili derivati anilina). Dobijena jedinjenja su obojena ($n \rightarrow \pi^*$, $\pi \rightarrow \pi^*$ elektronski prelazi): Azo boje



Industrijske boje sadrže $-\text{SO}_3\text{H}$ grupe koje su rastvorne u vodi. Omogućavaju vezivanje za tekstil.


Industrijske boje



metil-oranž

pH = 3,1, crveno

pH = 4,4, žuto



kongo-crveno

pH = 3,0, plavo-ljubičasto

pH = 5,0, crveno



Zadaci



Vežba 22-1

Nacrtajte strukutru svakog dalje navedenog jedinjenja i navedite gde najverovatnije dolazi do radikalskog halogenovanja zagrevanjem u prisustvu Br_2 . Zatim poređajte jedinjenja po opadajućoj reaktivnosti pod uslovima bromovanja. **(a)** etilbenzen; **(b)** 1,2-difeniletan; **(c)** 1,3-difenilpropan; **(d)** difenilmetan; **(e)** (1-metiletil)benzen.

Vežba 22-2

Koji će hlorid brže solvolizovati: (1-hloretil)benzen, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHCl}$, ili hlordifenilmetan, $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CHCl}$? Obrazložite vaš odgovor.



Vežba 22-3

Fenilmetanol (benzil-alkohol) se transformiše u (hlormetil)benzen u prisustvu hlorovodika mnogo brže nego što se etanol transformiše u hloretan. Objasnite.

Vežba 22-4


Koji molekul iz svakog od navedenih parova jedinjenja lakše reaguje s datim reagensima, i zašto?

(a) $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH}_2$ ili $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$, sa $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Li}$



Vežba 22-5

Napišite sintetičke sheme da povežete date polazne materijale i proizvode.



Vežba 22-6

Zašto je 3-nitrofenol (*m*-nitrofenol) manje kiseo od druga dva izomera, a kiseliji od fenola?

Vežba 22-7


Poređajte po rastućoj kiselosti: fenol, A; 3,4-dimetilfenol, B; 3-hidroksibenzenkarboksilnu (*m*-hidroksibenzoevu) kiselinu, C; 4-(fluormetil)fenol [*p*-(fluormetil)fenol)], D.

Vežba 22-8

Napišite očekivane proizvode reakcije 1-hlor-2,4-dinitrobenzena s NaOCH_3 u ključalom CH_3OH .

Vežba 22-9

Formulišite mehanizam navedene konverzije. Smatrajući da prva faza određuje brzinu reakcije, nacrtajte dijagram potencijalnih energija koji karakteriše reakciju. (**Pomoć:** ovo je reakcija nukleofilne aromatične supstitucije.)




Vežba 22-11

1-Hlor-4-metilbenzen (*p*-hlortoluen) nije dobar polazni materijal za sintezu 4-metilfenola (*p*-krezola) direktnom reakcijom s toplim NaOH, zato što nastaju dva proizvoda. Zbog čega je to tako, i koji su to proizvodi? Predložite sintezu iz metilbenzena (toluena).


Vežba 22-12

Objasnite regioselektivnost sledeće reakcije. (**Pomoć:** analizirajte uticaj metoksi-grupe na selektivnost napada amidnog jona na benizin.



Vežba 22-13

Orto-benzendiazonijum-karboksilat A (dobijen diazotovanjem 2-aminobenzojeve kiseline, zadatak 20-54) je eksplozivan. Zagrevanjem rastvora jedinjenja A i *trans,trans*-2,4-heksadiena, nastaje jedinjenje B. Objasnite pomoću mehanizma reakcije. (**Pomoć:** nastaju još dva gasovita proizvoda.)



Vežba 22-14

Predložite sintezu (4-fenilmetil)fenola (*p*-benzilfenola) iz benzena.

Vežba 22-17

Friedel-Crafts-ovo metilovanje metoksibenzena (anizola) pomoću hlormetana, u prisustvu AlCl_3 , daje smesu *orto*- i *para*-proizvoda u odnosu 2:1. Tretiranjem metoksibenzena 2-hlor-2-metilpropanom (*tert*-butil-hloridom) pod istim uslovima dobija se samo 1-metoksi-4-(1,1-dimetiletil)benzen (*p-tert*-butilanizol). Objasnite. (**Pomoć:** ponovite odeljak 16-5.)

Vežba 22-18

Formulišite mehanizam Kolbe-ove reakcije. (**Pomoć:** početak ovog procesa analogan je reakciji aldolne adicije; odeljak 18-5.)

Vežba 22-19


Heksahlorofen (videti naglasak 22-1) dobija se u jednoj fazi iz 2,4,5-trihlorfenola i formaldehida u prisustvu sumporne kiseline. Kako se vrši ova reakcija? (**Pomoć:** u prvoj fazi formulišite kiselo-katalizovano hidroksimetilovanje).

Vežba 22-22

Napišite najmanje dve rezonancione strukture svake reakcione vrste: fenoksidnog jona, fenoksi-radikala i semihinon radikal-anjona, prikazanih na prethodnoj shemi.

Vežba 22-23

Mehanistički objasnite navedeni rezultat. (**Pomoć:** podsetite se odeljka 18-9.)






Vežba 22-24

Vitamin C je dobar antioksidans zbog toga što je njegov oksidacioni proizvod stabilizovan rezonancijom. Napišite druge rezonancione oblike ove reakcione vrste.

Vežba 22-25

Predložite sinteze sledećih jedinjenja iz benzena.



Vežba 22-27

Napišite proizvode diazo-kuplovanja benzendiazonijum-hlorida sa navedenim molekulima:.


(a) metoksibenzen; (b) 1-hlor-3-metoksibenzen; (c) 1-(dimetilamino)-4-metilbenzen.

(Pomoć: diazo-kuplovanje je veoma osetljivo na sterne uticaje.)

6. Reakcijom fenola i formaldehida u kiselj ili baznoj sredini nastaje fenol-formaldehidni kopolimer koji se zove i fenolna smola (bakelit). Prikazite mehanizam kiselj katalizovane reakcije kojom se povezuju dve fenolne jedinice (prva faza reakcije je kiselj katalizovano hidroksimetilovanje).

5. Prepostavite redosled relativne stabilnosti benzil-katjona dobijenih iz a) hlormetilbenzena; b) 1-(hlormetil)-4-metoksibenzena i c) 1-(hlormetil)-4-nitrobenzena. Obrazložite odgovor pomoću rezonancionih struktura.

6. Poređajte data jedinjenja prema opadajućem redosledu reaktivnosti prema vodenom rastvoru baze.




7. Osmislite sintezu 1-brom-3-hlorbenzena polazeći od benzena (prikazati strukture intermedijera). Razmislite o benzendiazonijum-solima kao korisnim intermedijerima.


c) Objasnite kiselost 2,4,6-trinitrofenola (pikrinske kiseline) $pK_a = 0,25$.

15. Aromatični i alifatični amini različito reaguju sa azotastom kiselinom. Napišite očekivani(e) proizvod(e) svake od datih reakcija:

a)




b)




oranž I


6. a) Poređajte sledeća jedinjenja po redosledu opadajuće kiselosti:




A



B




C



D

> > > >






14. Aromatični i alifatični amini različito reaguju sa azotastom kiselinom. Proizvodi reakcija aromatičnih amina i azotaste kiseline koriste se za diazokuplovanje i dobijanje azo boja. Pred vama je nepotpuna sinteza 4-dimetilaminoazobenzena. U prazna polja upišite strukture koje nedostaju.



5. Reakcijom fenola i formaldehida u kiselj ili baznoj sredini nastaje fenol-formaldehidni kopolimer koji se zove i fenolna smola (bakelit). Prikažite mehanizam kiselj katalizovane reakcije kojom se povezuju dve fenolne jedinice i formaldehid (prva faza reakcije je kiselj katalizovano hidroksimetilovanje).

14. Poređajte sledeća jedinjenja:


a) Poređajte sledeća jedinjenja po redosledu opadajuće kiselosti:




___ > ___ > ___ > ___ > ___

5. Osmislite sintezu zadatih fenola. Svaku sintezu započnite polazeći od benzena ili mono-supstituisanog derivata benzena.


a)



b)






10. Napišite mehanizam dobijanja 4-dimetilaminoazobenzena polazeći iz N, N-dimetilanilina i odgovarajuće diazonijum soli.




4-dimetilaminoazobenzen

8. Prikažite strukture proizvoda koji nastaju u sledećim reakcijama:







d) objasnite selektivnost reakcije pod (c)

9. Cope-ovo premeštanje se primenjuje u reakcionoj sekvenci povećavanja prstena organskih jedinjenja. Prikažite strukture intermedijera u datoj shemi u kojoj je predstavljena sinteza desetočlanog prstena.





9. Poređajte data jedinjenja prema opadajućoj kiselosti:

CH_3OH	CH_3COOH				
------------------------	--------------------------	---	--	---	---


Zadaci

30. Napišite glavni očekivani proizvod (glavne očekivane proizvode) svih navedenih reakcija.




31. Predstavite mehanizam reakcije koja je opisana u zadatku 30(b).
32. Predložite sinteze svakog od datih jedinjenja polazeći uvek od etilbenzena: (a) (1-hloretil)benzen; (b) 2-fenilpropanska kiselina; (c) 2-feniletanol; (d) 2-feniloksaciklopropan.
33. Pretpostavite redosled relativne stabilnosti tri benzil-katjona dobijenih iz: hlormetilbenzena (benzil-hlorida); 1-(hlormetil)-4-metoksibenzena (4-metoksibenzil-hlorida) i 1-(hlormetil)-4-nitrobenzena (4-nitrobenzil-hlorida) i Obrazložite odgovor pomoću rezonancionih struktura.
34. Pomoću odgovarajućih rezonancionih struktura, objasnite zašto je nepovoljno vezi-
vanje halogenog atoma u para-položaj fenilmetil- (benzil-) radikala u odnosu na benzilni položaj.




41. Polazeći od benzenamina, predložite sintezu aklomida, sredstva kojim se leče neke retke fungalne infekcije i infekcije protozoama u veterini. Za opštu informaciju, navedeno je nekoliko intermedijera. Popunite prazna mesta; svako zahteva tri sukcesivne reakcije. (Pomoć: podsetite se oksidacija amino- u nitroarene, odeljak 16-5.)






42. Objasnite mehanizam navedene sintetičke transformacije. (Pomoć: neophodno je uzeti dva ekvivalenta butillitijuma.)








45. Napišite glavni očekivani proizvod (glavne očekivane proizvode) datih reakcija ili niza reakcija.









48. Polazeći od benzena, predložite sinteze datih derivata fenola.





49. Imenujte sva ova jedinjenja:




50. Napišite očekivani proizvod (očekivane proizvode) svake od datih reakcija ili reakcionih sekvenci.



58. Napišite najlogičnije strukture proizvoda dobijenih u datim reakcionim sekvencama.




U sledećoj reakciji pretpostavite da do elektrofilne supstitucije dolazi na prstenu koji je najviše aktiviran.




59. Navedite potrebne reagense za sintezu dalje navedenih jedinjenja diazo-kuplovanjem. Strukture videti u odeljku 22-11.

(a) metil-oranž

(b) kongo-crveno



mikrobiološki prevodi u sulfamilamid, 

(Slučajno otkriće antibakterijskih osobina prontosila 1930-ih godina indirektno je dovelo do razvoja sulfa-lekova kao antibiotika u 1940-im.)